

## Vaccination en milieu scolaire pour l'année scolaire 2022-2023

### École : Howard S. Billings

Cher parent,

Dans le cadre du programme de vaccination en milieu scolaire, certains vaccins seront offerts aux élèves du 3<sup>e</sup> secondaire. Au Québec, l'âge légal pour le consentement aux soins est de 14 ans. Votre enfant peut consentir lui-même à la vaccination. Ces informations vous sont fournies pour que vous le souteniez dans sa démarche.

*Extrait du code civil du Québec (1991, c. 64, a. 14): Le mineur âgé de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins et aux services requis par son état de santé.*

### La vaccination aura lieu le 22 et 23 novembre 2022.

- **S.V.P., assurez-vous d'avoir en mains le carnet de vaccination de votre enfant pour qu'il l'apporte à l'école le plus tôt possible.**
- **La carte d'assurance-maladie n'est pas nécessaire.**

#### Deux vaccins offerts à tous les élèves

**Le vaccin contre la diphtérie et le tétanos** est recommandé à votre enfant pour le protéger contre ces 2 maladies. La diphtérie et le tétanos sont des maladies graves causées par des bactéries. Il est important de faire vacciner les jeunes pour conserver la protection.

**Le vaccin contre le méningocoque de sérotype C** protège des infections graves comme la méningite et l'infection du sang. Une dose à l'adolescence est recommandée à tous.

#### Mise à jour du carnet de vaccination

L'infirmière consultera le dossier et vérifiera le carnet de vaccination de votre enfant pour savoir s'il a reçu les doses de vaccins indiquées pour son âge contre les maladies suivantes : diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, rougeole, rubéole, oreillons, varicelle, hépatite A, hépatite B et les infections à VPH.

Si des vaccins étaient manquants, ils pourront lui être administrés à l'école avec le consentement de votre enfant. Par exemple, si votre jeune n'a pas reçu 2 doses de vaccin contre les VPH depuis sa 4<sup>e</sup> année du primaire, il se verra offrir gratuitement une 1<sup>re</sup> dose de Gardasil 9® suivie de 1 dose de Cervarix® 6 mois plus tard lors de notre deuxième visite à l'école. Ce calendrier amène une réponse immunitaire plus forte contre les VPH 16 et 18 que 2 doses de Gardasil 9®.

**Important :** Si votre enfant présente une maladie chronique ou si votre enfant a un système immunitaire affaibli, il devrait en informer l'infirmière. Elle pourra conseiller votre enfant sur les vaccins additionnels indiqués pour sa condition, ainsi que le moment opportun pour les recevoir.

### Organisation de la vaccination à l'école

Chaque élève recevra un billet de rendez-vous dans la semaine précédente la vaccination indiquant la date et l'heure à laquelle sa présence est requise à la bibliothèque de l'école. Suite à une évaluation avec une infirmière, le formulaire de consentement sera complété et signé selon la décision de l'élève.

Le jour de la vaccination, nous recommandons le port d'un chandail à manches courtes pour faciliter la vaccination.

Pour plus d'informations sur la vaccination et les maladies évitables par la vaccination, consultez la section **Vaccination** du site du gouvernement du Québec à l'adresse suivante : [Québec.ca/vaccination](https://quebec.ca/vaccination)

En cas d'absence, une deuxième séance de vaccination aura lieu à l'école le 25 mai 2023. Il est aussi possible de prendre un rendez-vous en rattrapage au CLSC au 450-699-3333.

Merci de votre collaboration.

**Mélanie Grégoire**

Infirmière Clinicienne

Téléphone: 450-699-3333 Poste : 3566

melanie.gregoire.csssjr16@ssss.gouv.qc.ca

# Vaccin conjugué contre le méningocoque de séro groupe C

La vaccination,  
la meilleure protection

Août 2020

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections à méningocoque de séro groupe C et leurs complications. La méningite (infection des enveloppes du cerveau) et la méningococcémie (infection du sang) sont 2 infections graves causées par le méningocoque de séro groupe C. Il existe différents sérogroupes (ou types) de méningocoque entre autres les sérogroupes A, B, C, W et Y. Ce vaccin protège contre le séro groupe C.

Maladie	Signes et symptômes	Complications possibles
<b>Méningocoque de séro groupe C</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Forte fièvre</li><li>• Mal de tête important</li><li>• Nausées et vomissements</li><li>• Atteinte de l'état général</li><li>• Rougeurs ou petites hémorragies de la taille d'une tête d'épingle ou bleus sur la peau</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surdit�</li><li>• Cicatrices</li><li>• Dommages permanents au cerveau</li><li>• Amputation des mains ou des pieds</li><li>• D�c�s (5 � 15 % des cas m�me apr�s un traitement)</li></ul>

## Le vaccin

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections   m ningocoque de s ro groupe C et leurs complications. En g n ral, ce vaccin est administr    l' ge de 18 mois et en 3  ann e du secondaire.

## Les sympt mes apr s la vaccination

Des sympt mes peuvent  tre caus s par le vaccin (ex. : rougeur   l'endroit o  l'injection a  t  faite).

D'autres probl mes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de t te).

Le vaccin conjugu  contre le m ningocoque de s ro groupe C est s curitaire. La majorit  des r actions sont b nignes et de courte dur e.

Fr�quence	R�actions possibles au vaccin	Ce qu'il faut faire
Dans la majorit� des cas (plus de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Douleur � l'endroit o� l'injection a �t� faite</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer une compresse humide froide � l'endroit o� l'injection a �t� faite.</li><li>• Utiliser un m�dicament contre la fi�vre ou les malaises au besoin.</li><li>• Consulter un m�decin selon la gravit� des sympt�mes.</li></ul>
Tr�s souvent (moins de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rougeur et gonflement � l'endroit o� l'injection a �t� faite</li><li>• Fi�vre, somnolence (envie de dormir) et irritabilit�, surtout chez les enfants �g�s de moins de 5 ans</li><li>• Mal de t�te, malaise, douleur musculaire et douleur aux jointures, surtout chez les personnes �g�es de 11 ans et plus</li><li>• Perte d'app�tit, naus�es, vomissements, diarrh�e</li></ul>	

Il est recommand  de demeurer sur place au moins 15 minutes apr s une vaccination, car les r actions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une r action allergique survient, les sympt mes appara tront quelques minutes apr s la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette r action imm diatement sur place.

**Pour toute question, consultez Info-Sant  811 ou votre m decin.**

# Vaccin dT

Vaccin combiné contre la diphtérie et le tétanos

La vaccination,  
la meilleure protection

Août 2020

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la diphtérie, le tétanos et leurs complications.

Maladies	Signes et symptômes	Complications possibles
<b>Diphtérie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maux de gorge importants</li><li>• Forte fièvre</li><li>• Problèmes respiratoires</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Problèmes cardiaques</li><li>• Paralyse</li><li>• Décès (5 à 10 % des cas)</li></ul>
<b>Tétanos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spasmes musculaires de la mâchoire</li><li>• Spasmes des cordes vocales</li><li>• Spasmes musculaires de tout le corps</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Problèmes respiratoires et cardiaques</li><li>• Décès (10 à 80 % des cas)</li></ul>

## Le vaccin

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la diphtérie, le tétanos et leurs complications. Le vaccin dT est administré aux personnes âgées de 4 ans et plus qui ont besoin de protection contre ces 2 maladies. En général, ce vaccin est donné en 3<sup>e</sup> année du secondaire. Il est recommandé de recevoir une dose de rappel du vaccin dT à l'âge de 50 ans pour avoir la meilleure protection possible. Dans certaines circonstances, par exemple une plaie souillée, la dose de rappel est administrée avant ce délai.

## Les symptômes après la vaccination

Des symptômes peuvent être causés par le vaccin (ex. : rougeur à l'endroit où l'injection a été faite). D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Le vaccin dT est sécuritaire. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée.

Fréquence	Réactions possibles au vaccin	Ce qu'il faut faire
Dans la majorité des cas (plus de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Douleur à l'endroit où l'injection a été faite</li><li>• Fatigue, mal de tête</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.</li><li>• Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises au besoin.</li><li>• Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.</li></ul>
Très souvent (moins de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rougeur, gonflement à l'endroit où l'injection a été faite</li><li>• Malaises, étourdissements, nausées, diarrhée, frissons</li></ul>	
Souvent (moins de 10 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fièvre</li><li>• Perte d'appétit, vomissements</li><li>• Irritabilité, somnolence (envie de dormir)</li><li>• Rougeurs sur la peau</li><li>• Enflure des ganglions</li></ul>	
Parfois (moins de 1 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Petite bosse pendant quelques semaines à l'endroit où l'injection a été faite</li></ul>	
Très rarement (moins de 1 personne sur 10 000)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abscès stérile à l'endroit où l'injection a été faite</li></ul>	

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

**Pour toute question, consultez Info-Santé 811 ou votre médecin.**